


将唐君[®]



肠溶胶囊

说明书

【药品名称】

通用名：盐酸二甲双胍肠溶胶囊
商标名：将唐君[®]
英文名：Metformin Hydrochloride Enteric Capsules

【适应症】

- (1) 本品首选用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病，特别是肥胖的2型糖尿病。
- (2) 对于1型或2型糖尿病，本品与胰岛素合用，可增加胰岛素的降血糖作用，减少胰岛素用量，防止低血糖发生。
- (3) 本品也可与磺脲类等口服降血糖药合用，具协同作用。

【用法用量】

糖尿病治疗应根据血糖测定情况按个体化原则进行。从小剂量开始使用，根据病人状况，逐渐增加剂量。成人最大推荐量为每日1.8g。通常起始量为0.25g（1粒），每日2次，餐前服用。约一周后，如病情控制不满意，可加至一日3次，每次0.25g（1粒），逐渐加至每日1.8g，分次服用。

儿童患者的起始剂量一般为0.25g（1粒），每日2次，餐前服用。根据血糖控制情况，可酌情增加剂量，最高剂量可为每天1.8g，分次服用。

【包装规格】0.25g×48粒/盒

【药理作用】

盐酸二甲双胍是一种降血糖药，具有提高2型糖尿病患者的血糖耐受性，降低基础和餐后血糖的作用。盐酸二甲双胍的作用机理不同于其他类型的口服抗血糖药，它可减少肝糖的产生，降低肠对糖的吸收，并且可通过增加外周糖的摄取和利用而提高胰岛素的敏感性，与磺脲类药物不同的是，盐酸二甲双胍不会对2型糖尿病患者或正常血糖的患者产生低血糖症（除特殊情况-见完整说明书注意事项）。盐酸二甲双胍治疗后，胰岛素的分泌保持不变，而降低空腹胰岛素水平及每日血浆胰岛素水平。

【禁忌】

- (1) 肾脏疾病或下列情况禁用：心力衰竭（休克）、急性心肌梗塞和败血症等引起的肾功能障碍。
- (2) 需要药物治疗的充血性的心衰，和其他严重心、肺疾患。
- (3) 严重感染和外伤，外科手术，临床有低血糖和缺氧等。
- (4) 已知对盐酸二甲双胍过敏。
- (5) 急性或慢性代谢酸中毒，包括有或无昏迷的糖尿病酮症酸中毒，和糖尿病酮症酸中毒需要用胰岛素治疗。
- (6) 酗酒者。
- (7) 接受血管内注射碘化造影剂者，应暂时停用本品。
- (8) 维生素B12、叶酸缺乏未纠正者。

【有效期】24个月

餐前吃的二甲双胍！



微信公众号

 深圳市中联制药有限公司
CHINA ASSOCIATE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区丹青路9号

电话：0755-25739667 25726794

网址：www.zlzy.com 邮箱：cag8158@zlzy.com

药物警戒电话及邮箱：0755-25700016 ywj@zlzy.com

2024年01月第01版 第1次印刷

 国家基本药物
国家基本医疗保险甲类品种




将唐君[®]

盐酸二甲双胍肠溶胶囊

餐前吃的二甲双胍！

- ❏ 2型糖尿病调糖的基石用药，有效延缓并发症！
- ❏ 餐前服用二甲双胍，更科学，有效降低空腹和餐后高血糖！
- ❏ 餐前胃酸环境下不溶解，不刺激胃粘膜，避免普通片引发的肠胃不适！
- ❏ 肠溶胶囊较肠溶片和靶向给药时间窗溶出更快、更完全、吸收更好！
- ❏ 餐前服用方便，依从性好，生物利用度与同类上市品等效！

避免胃肠不适



肠溶胶囊

 深圳市中联制药有限公司
CHINA ASSOCIATE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2型糖尿病调糖的基石用药，有效延缓并发症！^{[1][2]}


二甲双胍是ADA、EASD等权威国际机构公认的2型糖尿病防治首选调糖药，有效降低血糖，单独使用不发生低血糖，有效延缓糖尿病并发症，特别是心血管病变。

餐前服用二甲双胍，更科学，有效降低空腹和餐后高血糖！^[3]

餐前提前服用，不仅不影响降低因肝糖原异生，肝糖输出造成的空腹高血糖，还更加充分的利用了二甲双胍增加外周组织对葡萄糖的利用，抑制肠壁细胞摄取葡萄糖，有效保证药物血浆浓度峰值，覆盖餐后血糖高峰，更好的降低餐后高血糖。


餐前胃酸环境下不溶解，不刺激胃粘膜，避免普通片引发的胃肠不适！^[4]

特殊肠溶剂型，耐酸力强，餐前胃酸环境下很少溶解或不溶解，不刺激胃黏膜，有效避免二甲双胍常见恶心、呕吐、腹泻等不良反应，解除胃肠道功能较差糖尿病患者的担忧。




肠溶胶囊较肠溶片在靶向给药时间窗溶出更快、更完全、吸收更好！^[5]

二甲双胍主要在小肠吸收，肠溶胶囊直接在小肠中溶解，快速达到有效累计浓度，减少消化道损耗，研究表明肠溶胶囊较肠溶片剂在有限的靶向给药时间窗内溶出更快、更完全、吸收更好。



餐前服用方便，依从性好，生物利用度与同类上市品等效！^[6]


餐前服用，服用方便，依从性好。其生物利用度与同类上市品君力达生物等效。



数据来源：上海药物代谢研究中心、兰州大学第一医院国家药品临床研究基地——将唐君®和君力达人体生物等效性试验研究



餐前吃的二甲双胍！



肠溶胶囊

【参考文献】

- [1] American Diabetes Association. Summary of revisions for the 2007~2009 clinical practice recommendation.
- [2] UK prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complication in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS34). Lancet 1998; 352: 854-865.
- [3] 巫广平, 陈小燕. 2型糖尿病二甲双胍疗效观察. 中国实用药学, 2009, 7, 4: 21.
- [4] 宋仪利. 二甲双胍肠溶剂与薄膜片疗效对比. 辽宁实用糖尿病杂志, 2003, 11: 1.
- [5] 宁俊红. 盐酸二甲双胍制剂溶出度的测定及比较. 药品评价, 2004, 1: 4.
- [6] 王婷, 钟大放. 盐酸二甲双胍肠溶胶囊人体生物等效性试验报告, 2008.